# KAMAGRA ORAL JELLY 100 mg

Neoficiální informační leták pro uživatele - česká verze

DŮLEŽITÉ: Tento dokument není výrobcem ani regulačním úřadem schválený příbalový leták a nenahrazuje originální dokumentaci konkrétního balení. Kamagra Oral Jelly není v EU standardně registrovaným léčivým přípravkem. Úplné pomocné látky se mohou lišit podle varianty/příchuti a bez originálního obalu nebo dokumentace výrobce je nelze bezpečně doplnit. Níže jsou proto uvedeny jen údaje, které lze spolehlivě doložit, spolu s obecnými bezpečnostními informacemi pro sildenafil.

## Obsah letáku


• 1. Co je Kamagra Oral Jelly a k čemu se sildenafil používá

• 2. Čemu věnovat pozornost před užitím

• 3. Jak se sildenafil užívá

• 4. Možné nežádoucí účinky

• 5. Uchovávání

• 6. Složení, balení a další informace


## 1. Co je Kamagra Oral Jelly a k čemu se používá

Kamagra Oral Jelly je perorální želé uváděné s léčivou látkou sildenafil ve formě sildenafil-citrátu. Sildenafil patří mezi inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). U mužů s erektilní dysfunkcí podporuje při sexuální stimulaci uvolnění cév v penisu a zvýšení průtoku krve. Bez sexuální stimulace sám erekci nevyvolává.

Určení: léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů. Není určeno osobám mladším 18 let ani ženám.

## 2. Čemu věnovat pozornost před užitím

**NEUŽÍVEJTE sildenafil a vyhledejte radu lékaře, pokud:**

• užíváte nitráty na bolest na hrudi (např. nitroglycerin, isosorbid) nebo donory oxidu dusnatého včetně amyl-nitritu („poppers“) - kombinace může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku;

• užíváte riociguat nebo jiný stimulátor rozpustné guanylátcyklázy;

• jste alergický na sildenafil nebo některou složku přípravku;

• máte závažné srdeční onemocnění a sexuální aktivita vám nebyla doporučena;

• máte velmi nízký krevní tlak (typicky pod 90/50 mmHg), závažné onemocnění jater, nebo jste nedávno prodělal infarkt či cévní mozkovou příhodu;

• jste někdy prodělal ztrátu zraku v důsledku NAION nebo máte některá vzácná dědičná onemocnění sítnice.

### Před použitím se poraďte s lékařem zejména při:

• srdečním nebo cévním onemocnění, vysokém či nízkém krevním tlaku;

• onemocnění ledvin nebo jater;

• srpkovité anémii, leukémii nebo mnohočetném myelomu;

• deformitě penisu nebo Peyronieho chorobě;

• žaludečním vředu nebo poruše srážlivosti krve;

• dřívějších závažných očních nebo sluchových potížích.

### Interakce s jinými léky

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech užívaných lécích. Zvláštní opatrnost je nutná u alfa-blokátorů, některých léků na vysoký krevní tlak, silných inhibitorů CYP3A4 (např. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol a některá antibiotika) a dalších přípravků na erektilní dysfunkci. Sildenafil nekombinujte s jinými PDE5 inhibitory bez výslovného doporučení lékaře.

### Jídlo a alkohol

Sildenafil lze užít s jídlem nebo bez něj; vydatné nebo tučné jídlo může nástup účinku zpomalit. Nadměrné množství alkoholu může zhoršit schopnost dosáhnout erekce a může zvýšit závratě nebo pokles krevního tlaku.

### Řízení a obsluha strojů

Sildenafil může způsobit závratě nebo poruchy vidění. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud nevíte, jak na vás působí.

## 3. Jak se sildenafil užívá

Důležité: 100 mg je maximální běžně doporučovaná jednotlivá dávka sildenafilu pro erektilní dysfunkci, nikoli obvyklá zahajovací dávka. U registrovaných přípravků se běžně začíná dávkou 50 mg a podle účinku a snášenlivosti se dávka upravuje na 25-100 mg.

• Užívejte pouze dávku doporučenou lékařem nebo lékárníkem.

• Sildenafil se obvykle užívá podle potřeby přibližně 1 hodinu před sexuální aktivitou; účinek se mezi lidmi liší.

• Neužívejte více než 100 mg během 24 hodin.

• Sexuální stimulace je pro účinek nezbytná.

• Pokud máte 100mg sáček, nepovažujte automaticky celý sáček za vhodnou dávku pro každého uživatele.

### Pokud užijete příliš mnoho

Vyšší dávky nezvyšují spolehlivě účinnost, ale zvyšují pravděpodobnost a závažnost nežádoucích účinků. Při předávkování nebo výrazných potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

## 4. Možné nežádoucí účinky

**Okamžitě přerušte užívání a vyhledejte lékařskou pomoc při:**

• bolesti na hrudi - neužívejte nitráty k její léčbě po sildenafilu;

• erekci trvající déle než 4 hodiny nebo bolestivé dlouhotrvající erekci;

• náhlém zhoršení nebo ztrátě zraku;

• náhlém zhoršení nebo ztrátě sluchu, zejména s hučením v uších či závratí;

• závažné alergické reakci (otok obličeje, rtů nebo hrdla, potíže s dýcháním);

• záchvatu, kolapsu nebo závažné kožní reakci.

### Častější nežádoucí účinky sildenafilu

• bolest hlavy;

• zrudnutí nebo pocit horka;

• zažívací potíže, pálení žáhy nebo nevolnost;

• ucpaný nos;

• závratě;

• poruchy vidění, rozmazané vidění nebo změna barevného vnímání.

Méně časté nebo vzácné účinky mohou zahrnovat bušení srdce, změny krevního tlaku, ospalost, krvácení z nosu, bolest očí, zvonění v uších, zvracení, kožní vyrážku a další reakce. Pokud je nežádoucí

účinek závažný, přetrvává nebo vás znepokojuje, kontaktujte lékaře nebo lékárníka.

## 5. Uchovávání

• Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

• Uchovávejte v původním neporušeném sáčku, v suchu, mimo přímé světlo a nadměrné teplo.

• Řiďte se teplotou a dobou použitelnosti uvedenou na konkrétním balení. U dostupné produktové dokumentace pro oral jelly se uvádí skladování pod 25 °C.

• Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti nebo pokud je sáček poškozený.

## 6. Složení, balení a další informace

### Ověřené údaje o složení

| Položka | Údaj |
|---|---|
| Léčivá látka | Sildenafil-citrát v množství odpovídajícím 100 mg sildenafilu v jednom 5g sáčku. |
| Léková forma | Perorální želé (oral jelly). |
| Balení | Běžně 7 x 5 g sáčků („1 week pack“); mohou existovat různé varianty balení. |
| Výrobce uváděný na produktové dokumentaci | Ajanta Pharma Ltd., Indie. |
| Pomocné látky | Úplný seznam nebyl z důvěryhodné oficiální dokumentace ověřen. Některé dostupné materiály uvádějí barviva Quinoline Yellow WS, Sunset Yellow FCF, Ponceau 4R a Brilliant Blue FCF; složení se může lišit podle příchuti/varianty. Pro bezpečný oficiální leták je nutné opsat pomocné látky z konkrétního originálního balení nebo dokumentace výrobce. |

### Regulační upozornění

Tento dokument byl vytvořen jako bezpečnostní a informační souhrn. Není prezentován jako originální příbalová informace výrobce ani jako doklad registrace. Při prodeji nebo distribuci léčiv je nutné použít dokumentaci a označení vyžadované příslušným národním regulačním orgánem.

### Zdroje použité pro zdravotní informace

• Electronic Medicines Compendium (eMC): Sildenafil 25/50/100 mg - Patient Information Leaflet a Summary of Product Characteristics, aktualizace 2026.
• eMC: Viagra 100 mg - Summary of Product Characteristics.
• FDA: sildenafil prescribing information (kontraindikace nitrátů a riociguatu).
• Dostupná produktová dokumentace Kamagra Oral Jelly/Ajanta: 100 mg sildenafilu v 5g sáčku, oral jelly, 7 x 5 g.

Verze dokumentu: 1. srpna 2026